



FEMANNOSE® N D-МАНОЗА

За лечение и профилактика на цистит и други неусложнени инфекции на долните пикочни пътища

Саше

1. Описание, състав и начин на употреба на Femannose® N

1.1 Механизъм на действие

Циститът (възпаление на пикочния мехур) и свързаните с него състояния са микробни заболявания, които засягат предимно пикочния мехур и уретрата. Те се отключват предимно от навлизането на непатогенни бактерии от микрофлората на долния стомашно-чревен тракт, когато тези бактерии попаднат в условия, които им позволяват да прилепнат и да се развиват върху стената на пикочния мехур и в пикочните пътища.

Тези състояния се срещат най-често при млади жени, по време на бременност и през пери- и постменопаузата, но понякога се срещат и при по-възрастни мъже или катетеризирани пациенти.

Настоящата терапия от първа линия за лечение на цистит е прилагането на антибиотици. Въпреки това, много бактерии са резистентни и могат да доведат до повторна поява на инфекцията.

Femannose® N е медицинско изделие показано за лечение и профилактика на цистит и други неусложнени бактериални инфекции на долните пикочни пътища.

D-манозата може да облекчи най-честите симптоми на инфекция на долните пикочни пътища (парене по време на уриниране, често уриниране, спешност за уриниране и др.), когато са причинени от бактерии от типа Ешерихия коли.

D-манозата е епимер на глюкозата, който ефективно предотвратява прилепването на патогени към епитела на пикочните пътища, като по този начин инхибира прикрепването на микроби, които нахлуват в урогениталния тракт. Това намалява вирулентността или способността за прилепване към тъканите на пикочните пътища и помага за физическо предотвратяване на повторната поява на инфекции.

Femannose® N за профилактика или лечение на цистит и други бактериални инфекции на пикочните пътища може да има синергично действие заедно с антибиотиците, тъй като антимикробният механизъм на действие е различен и не се припокрива. По-специално, Femannose® N и неговите съставки не допринасят за развитието на резистентност.

1.2 Състав

Всяко саше съдържа:

2 g D-mannose(D-маноза)

Помощни вещества: подсладители: фруктоза, сукралоза; лимонена киселина; оцветител: цвекло; антислепващ агент: силициев диоксид; аромати.

2. Опаковка

Една опаковка съдържа 14 сашета по 4 g всяко.

3. Дозировка и указания за употреба:

За възрастни и деца над 14 години.

За лечение на остър цистит се препоръчва следната дозировка:

Ден	Брой сашета дневно
1 до 3 ден	3
4 и 5 ден	2

Препоръчителната доза за предпазване от цистит е едно саше дневно.

Приемът трябва да се разпредели през целия ден. Препоръчително е продуктът да се приема между храненията.

Разтворете съдържанието на едно саше в чаша вода. Препоръчително е да пиете поне два литра вода на ден, за да стимулирате уринирането. За предотвратяване на повторна поява на инфекцията, лечението трябва да продължи един месец.

4. Нежелани реакции

Специални тестове показват, че съставките на Femannose® N са безвредни, напълно биосъвместими и се понасят добре. При дозировката, необходима за постигане на терапевтичен ефект, не са наблюдавани нежелани реакции, освен в случаите на индивидуална непоносимост, която може да доведе до гадене, подуване на корема и меки изпражнения. Ако симптомите продължават, консултирайте се с Вашия лекар.

5. Взаимодействия с хранителни добавки и лекарствени продукти

Не е известно съставките на Femannose® N да взаимодействат с хранителни добавки. Въпреки това е добре хранителните добавки, включващи витамини, хранителни вещества, растителните и хомеопатичните лекарствени продукти да се приемат най-малко два часа преди или след употребата на Femannose® N. Лекарствени взаимодействия: Едновременният прием на Femannose® N не влияе върху ефикасността на антибиотиците. Антиадхезивното действие на D-манозата не води до резистентност. Манозата не се метаболизира и следователно не взаимодейства с други вещества.

6. Съхранение

Съхранявайте Femannose® N на сухо място, далеч от пряка светлина и топлина. Отваряйте сашето непосредствено преди употреба. Съхранявайте на температура под 25 °C.

7. Предупреждения и предпазни мерки

Използвайте Femannose® N само след предварителна консултация с Вашия лекар или фармацевт.

Femannose® N не е заместител на антибиотичното лечение на инфекции на пикочните пътища.
Не използвайте Femannose® N, ако имате свръхчувствителност, като алергия или непоносимост към някоя от съставките.

По време на бременност и кърмене, продуктът се използва само след консултация с лекар. Продуктът не се използва при деца под 14 години.

Не превишавайте препоръчителната доза!
Ако симптомите не се подобрят чувствително след три дни, спрете приема на продукта и се консултирайте с лекар.
Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не приемайте Femannose® N повече от 30 дни. Ако симптомите продължават, консултирайте се с лекар.
Всяко саше е за еднократна употреба и трябва да се отваря непосредствено преди употреба.

8. Срок на годност

Не използвайте продукта след изтичане на датата, отпечатана на опаковката.
Срокът на годност се отнася за продукт, съхраняван в ненарушена опаковка.

9. Изхвърляне

Продуктите с изтекъл срок на годност се изхвърлят в съответствие с местните екологични разпоредби. Не изхвърляйте продукта и неговата опаковка в околната среда.

Последна редакция: август 2022 г.

Предлага се изключително в аптеките

веган



Условия на съхранение

Медицинско изделие

S.I.I.T. srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ИТАЛИЯ

Дистрибутор

Фьоникс Фарма ЕООД
Околовръстен път 199А
1700 София

03011117/1 26000515 01P0622 16 9901156BG